

2025 ÜRÜN
KATALOĞU

AgroLanter®

HIGH QUALITY FERTILIZER

TOZ FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

FOLIAR FERTILIZER

MACRO

TOLMIX®

10-5-5+(3,5 MgO)+ME

TOZ FORMÜLASYON
ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ



Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%10
Amonyum Azotu (N)	%1
Nitrat Azotu (N)	%1
Üre Azotu (N)	%8
Nötral Amonyum Sitrata Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	%3.5
Suda Çözünür Bor (B)	%0.1
Suda Çözünür Demir (Fe)	%3
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%6

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Sera ve Açık Alan Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz	İlk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Yapraklı Yeniden Kışık Sebzeler Kıvrık, Marul, Lahana, Ispanak vb.	3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Yumru Bitkiler Patates, Sogan, Havuç, Kavun, Karpuz, Kabak vb	4-6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Tüm Meyve Ağaçları Turuncgiller, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Zeytin, Fındık, A.Fıstığı vb	Gelişimin başlaması ile birlikte iki veya üç tekerrürde uygulanır. Topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Endüstri Bitkileri Pamuk, Ayçiçeği, Mısır vb	5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Tüm Baklagiller Nohut, Fasulye, Soya, Mercimek, Bezelye vb.	5-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Tahıllar Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb.	Kardeşlenme döneminde, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Yeşil Alanlar	Gelişme dönemi boyunca, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g



Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dokümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.

MACRO
TOL[®]
27-9-18+ME

TOZ FORMÜLASYON
ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ



Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%27
Amonyum Azotu (N)	%1.8
Nitrat Azotu (N)	%5.2
Üre Azotu (N)	%20
Nötral Amonyum Sitrata Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%9
Suda Çözünür Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%9
Suda Çözünür Potasyum Oksit	%18
Suda Çözünür Bor (B)	%0.03
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0.04
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0.004

Bitki	Kullanım Şekli ve Dozu
Sera ve Açık Alan Sebzeler Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek, Kavun, Karpuz	İlk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Yaprağı Yeneyen Kışık Sebzeler Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.	3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Yumrulu Bitkiler Patates, Sogan, Havuç, Kavun, Karpuz, Kabak vb	4-6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Tüm Meyve Ağaçları Turunçgiller, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Zeytin, Fındık, A.Fıstığı vb	Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekerürde uygulanır. Topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Endüstri Bitkileri Pamuk, Ayçiçeği, Mısır vb	5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Tüm Baklagiller Nohut, Fasulye, Soya, Mercimek, Bezelye vb.	5-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Tahıllar Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb.	Kardeşlenme döneminde, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g
Yeşil Alanlar	Gelişme dönemi boyunca, topraktan damlama sulama ile 1-2kg/da, yapraktan 100 L suya 150-200 g



Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.

TRACEMIX®

TOZ FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

MICRO PLANT NUTRIENT MIXTURE



Garanti Edilen İçerik

W/W

Suda Çözünür Bor (B)

%4

Suda Çözünür Mangan (Mn)

%0,5

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%0,5

Bitki

Kullanım Şekli ve Dozu

Narenciye, Nar

Temmuz ve Ağustos aylarında 10-15 gün arayla 500 g/100L su dozunda 2 uygulama

Elma

Çiçeklenme periyodu ile başlayarak 10-15 gün arayla 250 g/100L su dozunda 3 uygulama, Temmuz ve Ağustos aylarında 10-15 gün arayla 500 g/100L su dozunda 2 uygulama

Armut

Haziran sonu ile birlikte Temmuz aylarında 10-15 gün arayla 250 g/100L su dozunda 2 uygulama

Örtü Altı Sebze
Yetiştiriciliği

Temmuz ve Ağustos aylarında 10-15 gün arayla 250 g/100L su dozunda 2 uygulama

Açık Tarla Sebze
Yetiştiriciliği

Temmuz ve Ağustos aylarında 10-15 gün arayla 250 g/100L su dozunda 2 uygulama

Bağ

Temmuz ve Ağustos aylarında 10-15 gün arayla 250 g/100L su dozunda 2 uygulama

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



MOLY ZnB®

TOZ FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ



Garanti Edilen İçerik	W/W
Suda Çözünür Bor (B)	%3
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%3

Bitki	Yapraktan	Topraktan
Sera Sebzelerinde	100 L suya 50-75 g	100-150 g/da
Açık Alan Sebzelerde	100 L suya 50-75 g	100-150 g/da
Yaprağı Yeneb Sebzeler	100 L suya 50-75 g	100-150 g/da
Meyve Ağaçlarında	100 L suya 50-75 g	100-150 g/da
Narenciye	100 L suya 50-75 g	100-150 g/da
Zeytin, Fındık, Muz	100 L suya 50-75 g	100-150 g/da
Bağımlarda	100 L suya 50-75 g	100-150 g/da
Ayçiçeği, Mısır	100 L suya 100-150 g (10-14 yaprak arası)	-
Hububat ve Yeşil Alanlar	100 L suya 100-150 g	-

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



NUTRISELL®

8-36-5

TOZ FORMÜLASYON
ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

NPK FERTILIZER BLENDED



Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%8
Amonyum Azotu (N)	%8
Nötral Amonyum Sitrata Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%36
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5

Bitki Çeşidi	Kullanım Miktar (Kg/da)	Damladan	Yaprak Uygulaması
Sera Sebzeleri Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, vb.	Fide dikimi itibari ile gelişme süresince 2-3 uygulama 0,5-1 Kg/da 100 L Suya 100-150 g	0,5-1 Kg/da	100 L Suya 100-150 g
Muz		0,5-1 Kg/da	100 L Suya 100-150 g
Meyve Ağaçları		0,5-1 Kg/da	100 L Suya 100-150 g
Fidelik ve Fidanlarda		0,5-1 Kg/da	100 L Suya 100-150 g

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



MICROLIG®

TOZ FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

EC FERTİLİZER



Garanti Edilen İçerik

W/W

Suda Çözünür Bor (B)	%1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)	%6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%6
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%6

Bitki Çeşidi	Toprakdan	Toprakdan Uygulama (Damlama Sulama ile)	Yapraktan Uygulama (100 L Suya)
Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.)	İlk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla	1-2 kg/da	150-200 g
Yaprağı Yeneyen Kışık Sebzeler (Kıvrıkcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.)	3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1-2 kg/da	150-200 g
Yumru Bitkiler (Patates, Soğan, Kavun, Karpuz, Kabak)	4-6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla	1-2 kg/da	150-200 g
Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Erik, Armut, Turuncgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı)	Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekerrürde uygulanır.	1-2 kg/da	150-200 g
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği)	5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	1-2 kg/da	150-200 g
Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Ayçiçeği)	5-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra	1-2 kg/da	150-200 g
Tahıllar (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardeşlenme döneminde	1-2 kg/da	150-200 g
Yeşil Alanlar	Gelişme dönemi boyunca	1-2 kg/da	150-200 g

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



FUSERPLEX®

pH Düşürücü
Karışım Ajanı

PH DÜŞÜRÜCÜ, YAYICI, YAPIŞTIRICI



FuserPlex®, kullanım alanlarına göre değişiklik gösteren çok fonksiyonlu bir tamamlayıcı üründür. Bitki besleme ürünleri ve ilaç karışımları arasında, özellikle yapraktan sprey uygulamalarında pH seviyesini düşürerek ürünlerin etkinliğini artırırken, çoklu ürün karışımlarında da etkileşimleri tamponlayarak çözücü görevini üstlenir.

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dokümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



130 gr



SIVI FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

FOLIAR FERTILIZER

TQUAJE®

3-20-0

SIVI FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

NP SOLUTION FERTILIZER



Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%3
Üre Azotu (N-NH ₂)	%3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%20
Biüresi düşük	

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan
Açık Alan Sebzelere	Çiçeklenmeden önce 100 L suya 40-80 ml (50-75 g) Her 7-8 gün-de bir uygulama	100-200 ml/da (125-250 g/da)
Seralarda	Çiçeklenmeden önce 100 L suya 40-60 ml (50-75 g) Her 7-8 gün-de bir uygulama	100-200 ml/da (125-250 g/da)
Yumuşak Çekirdekli Meyveler	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce 100 L suya 60ml (75 g) Çiçeklenmeden sonra 100 L suya 60ml (75 g)	200-250 ml/da (250-312,5 g/da)
Sert Çekirdekli Meyveler	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce 100 L suya 60ml (75 g) Çiçeklenme sonra 100 L suya 60ml (75 g)	200-250 ml/da (250-312,5 g/da)
Bağlarda	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce 100 L suya 60ml (75 g) Çiçeklenme sonra 100 L suya 60ml (75 g)	20-250 ml/da (250-312,5 g/da)
Narenciye, Zeytin Ağacı	Çiçeklenmeden 10-15 gün önce 100 L suya 60ml (75 g) Çiçeklenme sonra 100 L suya 60ml (75 g)	200-250 ml/da (250-312,5 g/da)

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



LIQUID®

8-11-5

NP SOLUTION FERTILIZER



SIVI FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%8
Üre Azotu (N-NH ₂)	%8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%11
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan
TURUNÇGİL	Çiçek petal yaprak dökümü sonrası	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvrık, Marul, Lahana, Ispanak vb.)	Dikimden sonra 2-3 uygulama	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)
YUMRULU BİTKİLER (Şekerpancarı, Patates, Soğan vb.)	4-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra tekrar	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)
KAVUN, KARPUZ, KABAK	Fide dikiminden hasada kadar	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Elma, Zeytin, Turunçgiller, A.Fıstığı vb.)	Gelişme dönemi boyunca	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)
MUZ	Meyve olgunlaşması esnasında	
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği vb.)	5-6 yapraklı dönemden dönemde itibaren 15-20 gün aralıklarla	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya Ayçiçeği vb.)	3-4 yapraklı olduğu dönemde ve 15-20 gün sonra	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	Kardeşlenme döneminde	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, çilek vb.)	Meyve oluşumu ile beraber	100 L Suya 100-150 ml (100 L Suya 125 - 187,5 g)

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



AQUA MARINE®

SIVI FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
LIQUID SEAWEED



Garanti Edilen İçerik

W/W

Organik Madde

%15

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

%6

Alginitik Asit

%0,6

Maksimum EC

10 dS /m

pH Aralığı

8-10

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan
Narenciye	1.Uyg: İlk baharda büyüme başlangıcında 2.Uyg: Çiçeklenmeden 2 hafta önce 3. Uyg: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra ihtiyaca göre 2-4 haftada bir uygulanabilir.	250 – 450 ml /100 L Su
Bağ	1. Uyg: sürgün gelişme devresinde 2. Uyg: Sürgünler 25-30 cm iken 3. Uyg: Çiçeklenmeden 5 gün önce 4.Uyg: Dönenin irime aşaması, 5.Uyg: Ben düşme devresinde	250 – 450 ml /100 L Su
Zeytin	1. Uyg: Erken ilkbaharda 2. Uyg: Çiçeklenmeden 2 hafta önce ihtiyaca göre hasada kadar 2-4 haftada bir.	250 – 450 ml /100 L Su
Yumuşak Çekirdekli Meyveler	1.Uyg: Tomurcuklanma döneminde 2. Uyg: Pembe tomurcuk döneminde 3. Uyg: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra 4. Uyg: Erken meyve döneminde ihtiyaca göre 2-4 haftada bir uygulanabilir.	250 – 450 ml /100 L Su
Sert Çekirdekli Meyveler	1.Uyg: Pembe/Beyaz tomurcuk döneminde 2.Uyg: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra 3. Uyg: Çekirdek oluşum Evresinde ihtiyaca göre 2-4 haftada bir uygulama yapılabilir.	250 – 450 ml /100 L Su
Muz	1.Uyg: Onarım döneminde 2.Uyg: Birinci uygulamadan 40-50 gün sonra 3. Uyg: Çiçeklenme döneminde 4. Uyg: Meyvenin büyüme aşamasında	200 ml /100 L Su
Açık Alan ve Örtü Altı Sebzeler	1.Uyg: Fidelelerin şaşırtma döneminde (toprakdan ve yaprakdan) 2.Uyg: Hasat tamamlanana kadar 15-20 günde bir tekrarlayın.	200 – 300 ml /da
Nar, Trabzon Hurması, Avokado	1.Uyg: İlk baharda büyüme başlangıcında 2.Uyg: Çiçeklenmeden 2 hafta önce 3. Uyg: Çiçek taç yaprakların dökülmesinden sonra ihtiyaca göre 2-3 haftada bir uygulama yapılabilir.	200 – 300 ml /100 L Su
Pamuk	İlk uygulama: Ekim de toprak uygulaması Tekrarlama: Hasat tamamlanana kadar 15-20 günde bir toprak ya da yaprak uygulaması	100 – 200 ml /da
Tahıl ve Endüstri Bitkileri	Tüm Periyotlarda uygulanır.	100 – 150 ml /da
Çiçek Yetiştiriciliği	İlk gelişim dönemlerinde 2-3 uygulama	50-100 ml /da
Yumur ve Kök Sebzeler	İlk uygulama; ekimde toprak uygulaması tekrarlama hasat tamamlanana kadar 14-21 günde bir.	200-300 ml /da



Foliar
Application

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.

PLEX[®]

AMINO

SIVI FORMÜLASYON
ÖZEL YAPRAK
GÜBRELERİ

LIQUID ORGANIC FERTILIZER CONTAINING
ANIMAL ORIGIN AMINOACID



Garanti Edilen İçerik	W/W
Organik Madde	%58
Organik Karbon	%20
Organik Azot	%8
Serbest Aminoasitler	%14
pH Aralığı	5,5 - 7,5

Bitki	Kullanım Dönemi	Toprakтан	Yapraktan
Şeftali, Kiraz Kayısı	Erken çiçeklenme dönemi itibari ile her 15-20 günde bir 3 uygulama	2 L / da 100 L Su ile	200-300 ml/100 L Su
Nektarin	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 20 günde bir 3 uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	150 ml/100 L Su
Bağ	Bahar sürgün döneminden itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama	1 L / da 100 L Su ile	200-300 ml /100 L Su
Marul (Tarla)	Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	150-250 ml/ da
Erik	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 20 günde bir 3 uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	100 ml/100 L Su
Badem	1. uygulama meyve tutumu sonrası, 2. uygulama 20 gün sonra	2 L / da 100 L Su ile	250 ml/100 L Su
Zeytin	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	250-400 ml/100 L Su
Tahıllar (Buğday, Arpa)	Kardeşlenme dönemi itibari ile 3 uygulama 4 yapraklı dönem, 6 yapraklı dönem ve püskül oluşumu 4 yapraklı dönem, 6 yapraklı dönem ve püskül oluşumu itibari ile toplam 3 uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	300-500 ml /da
Mısır	4 yapraklı dönem ve püskül oluşumu itibari ile toplam 3 uygulama	2 L / da 100 L Su ile	300-500 ml/ da
Ayçiçeği	1. uygulama 4-6 yaprak dönemi, 2. uygulama 20 gün sonra	1,5 L / da 100 L Su ile	200 ml/da
Pamuk	1. uygulama taraklanma başlangıcında, 2. uygulama erken çiçeklenme, 3. uygulama koza açım dönemi	1 L / da 100 L Su ile	200 ml/da
Şekerpancarı	2 yapraklı dönemden itibaren 15 günde bir 3 uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml /da
Patates	Çimlenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama	2,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml /100 L Su

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dokümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



 **Soil**
Application

 **Foliar**
Application



AVION[®]

SIVI FORMÜLASYON
ÖZEL YAPRAK
GÜBRELERİ

EC FERTILIZER LIQUID NITROGEN FERTILIZER



Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%24
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	%6
Nitrat Azotu (N-NO ₃)	%6
Üre Azotu (N-NH ₂)	%12

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan (100 L Su)	Toprakтан
Bağ, Zeytin	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca	200-300 ml (240-360 g)	5-10 L (6-12 kg)/ da
Turunçgil, Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler, Nar	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca	200-300 ml (240-360 g)	10-15 (12-18 kg)/ da
Sebzeler ve Çilek	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca	**	10-15 L (12-18 kg)/ da
Fidanlıklar	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca	200-250 ml (240-300 g)	5-10 L (6-12 kg)/ da
Kesme Çiçekler, Yeşil Alanlar	Büyüme dönemi boyunca	100-200 ml (120-240 g)	5-10 L (6-12 kg)/ da
Endüstri Bitkileri ve Tahıllar	Büyüme dönemi boyunca	**	1-3 kg/da (4-5 L Suda Sulandırarak)
Muz	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca	200-300 ml (240-360 g)	5-10 L (6-12 kg)/ da
Avokado	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca	200-300 ml (240-360 g)	10-15 L (12-18 kg)/ da
Ceviz	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca	200-300 ml (240-360 g)	5-10L (6-12 kg)/ da
Trabzon Hurması	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca	100-200 ml (120-240 g)	10-15 L (12-18 kg)/ da
Diğer Meyve Ağaçları	Vejetatif büyüme ve gelişim boyunca		5-10L (6-12 kg)/ da

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



CADMIPHOS®

5-25-0 + ME

SIVI FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

EC FERTILIZER NP FERTILIZER SOLUTION



Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%5
Üre Azotu (N-NH ₂)	%5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	%25
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%5

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan
Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Çilek vb.)	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgunlaşana kadar 3-4 uygulama yapılır.	200-250 ml (260-325 g)/da
Yaprığı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	200-250 ml (260-325 g)/da
Yumruklu Bitkiler (Şekerpancarı, Patates vb.)	Çapadan sonra bir uygulama, 15-20 gün sonra ikinci uygulama	200-250 ml (260-325 g)/da
Kavun, Karpuz, Kabak	Kol atımında, meyve tutumunda 3-4 uygulama	200-250 ml (260-325 g)/da
Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Erik, Elma, Armut, Turunçgiller, Zeytin, Fındık vb.)	Vejetasyon süresince 3-4 uygulama	200-250 ml (260-325 g)/da
Muz	Fide dikiminden bir ay sonra başlayarak doğuma kadar 3-4 uygulama	200-250 ml (260-325 g)/da
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği vb.)	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2-3 uygulama	200-250 ml (260-325 g)/da
Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya vb.)	Gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama	200-250 ml (260-325 g)/da
Tahıllar (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde iki uygulama	200-250 ml (260-325 g)/da

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.

 **Soil**
Application

 **Foliar**
Application



CALSI®

SIVI FORMÜLASYON
ÖZEL YAPRAK
GÜBRELERİ

EC FERTILIZER CALCIUM NITRATE SOLUTION



Garanti Edilen İçerik

W/W

Toplam Azot (N)

%8

Nitrat Azotu (N-NO₃)

%8

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)

%14

Bitki	Kullanım Dönemi	Toprakdan	Yapraktan
Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Çilek, Kavun, Karpuz)	Meyve tutumundan sonra gelişme dönemi boyunca	2-3 L (2,7-4,05 kg)/da	200-250 ml (270-337,5 g)
Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Marul, Lahana)	3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla	2-3 L (2,7-4,05 kg)/da	200-250 ml (270-337,5 g)
Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Havuç, Turp vb.)	4-6 yapraklı dönemden itibaren ve yumrular ceviz iriliğinde iken	2-3 L (2,7-4,05 kg)/da	200-250 ml (270-337,5 g)
Tüm Meyve Ağaçları (Turunçgiller, Kayısı, Erik, Zeytin, Bağ, A.Fıstığı)	Meyveler fındık iriliğinde iken 15-20 gün ara ile 2 defa	2-3 L (2,7-4,05 kg)/da	250-300 ml (270-337,5 g)
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği, Yer Fıstığı)	Bitkiler 5-6 yapraklı dönemde iken bir defa, bitkiler meyve tutumu döneminde bir defa	2-3 L (2,7-4,05 kg)/da	200-250 ml (270-337,5 g)
Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Soya, Bezelye vb.)	5-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra	2-3 L (2,7-4,05 kg)/da	200-250 ml (270-337,5 g)
Tahıllar (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	Bitkinin boyunun 20-25 cm olduğu dönemde	2-3 L (2,7-4,05 kg)/da	200-250 ml (270-337,5 g)
Muz	Gelişme dönemi boyunca	3-5 L (4,05-6,75 kg)/da	200-250 ml (270-337,5 g)
Elma, Kiraz, Nektarin	Meyveler fındık iriliği itibarıyla 4-5 uygulama	2-3 L (2,7-4,05 kg)/da	200-250 ml (270-337,5 g)

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



Soil Application **Foliar** Application



CRAFT[®]

AMINO

SIVI FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

LIQUID ORGANIC FERTILIZER CONTAINING
ANIMAL ORIGIN AMINOACID



Garanti Edilen İçerik

W/W

Organik Madde

%40

Organik Karbon

%14

Organik Azot

%5,5

Serbest Aminoasitler

%10

pH Aralığı

5,5 - 7,5

Bitki	Kullanım Dönemi	Toprakdan	Yapraktan
Badem	1. uygulama meyve tutumu sonrası, 2. uygulama 20 gün sonra	2 L / da 100 L Su ile	250 ml / 100 L Su
Zeytin	Su Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	250-400 ml / 100 L
Patates	Su Çimlenmeden 25-30 gün sonra, 20 günde bir 3 uygulama	2,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L
Fasulye, Mercimek, Nohut	3 yaprak döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama	1 L / da 100 L Su ile	250 ml / da
Nar	Su Çiçeklenme dönemi sonrası 20 günde bir 3 uygulama	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / 100 L
Antepfıstığı, Ceviz, Kestane	Su Erken çiçeklenme dönemi itibari ile 15 günde bir uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / 100 L
Muz	Çiçeklenme başlangıcı ve 30 gün sonra olmak üzere 2 uygulama	2 L / da 100 L Su ile	200 ml / 100 L Su
Şekerpancarı	2 yapraklı dönemden itibaren 15 günde bir 3 uygulama	1,5 L / da 100 L Su ile	200-300 ml / da
Buğday, Arpa, Çeltik	1. Uyg: Vejetasyon dönemi başlangıcı, 2. Uyg: 20 gün sonra	1,5 L / da 100 L Su ile	300-500 ml / da
Mısır	Kardeşlenme dönemi itibari ile 3 uygulama 4 yapraklı dönem, 6 yapraklı dönem ve püskül oluşumu itibari ile toplam 3 uygulama	2 L / da 100 L Su ile	300-500 ml / da
Ayçiçeği	1. Uyg: 4-6 yaprak dönemi, 2. Uyg: 20 gün sonra	1,5 L / da 100 L Su ile	200 ml / da
Pamuk	1. Uyg: Taraklanma başlangıcında, 2. Uyg: Erken çiçeklenme, 3. Uyg: Koza açım dönemi	1 L / da 100 L Su ile	200 ml / da

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dokümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



Soil
Application



Foliar
Application



EXPRESS K[®]

3-0-25

SIVI FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

EC FERTILIZER
NK FERTILIZER SOLUTION



Garanti Edilen İçerik

W/W

Toplam Azot (N)

%3

Üret Azot (N-NH₂)

%3

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

%25

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan	Topraktan
Turuncgiller	Meyve tutumundan itibaren meyve hasat olgunluğuna ulaşınca kadar toplam 3-5 uygulama yapılmalıdır.	250-300 ml (325-390 g)	2-3 L (2,6 - 3,9 kg) /da
Sebzeler	Meyvenin hızlı gelişim dönemlerinde 2-3 uygulama yapılmalıdır.	200-250 ml (260-325 g)	2-3 L (2,6 - 3,9 kg) /da
Meyve Ağaçları	Meyve tutumundan sonra 3-5 uygulama yapılmalıdır.	200-300 ml (260-390 g)	2-3 L (2,6 - 3,9 kg) /da
Zeytin	Meyve tutumundan sonra 3-5 uygulama yapılmalıdır.	200-300 ml (260-390 g)	2-3 L (2,6 - 3,9 kg) /da
Bağ	Tane teşekkülünden hasada kadar 2-3 uygulama yapılmalıdır.	200-300 ml (260-390 g)	2-3 L (2,6 - 3,9 kg) /da
Kesme Çiçekler	Sezon içerisinde 1-2 uygulama	150-200 ml (195-260 g)	1-2 L (1,3 - 2,6 kg) /da
Tarla ve Endüstri Bitkileri	Ekim veya şaşırtmadan 4-5 hafta sonrası ile hasat arasında kalan dönemde	200-300 ml (260-390 g)	1-2 L (1,3 - 2,6 kg) /da
Yaprağı Yenen Sebzeler	Şaşırtmadan 6-8 hafta sonra uygulamaya başlanır hasattan 10 gün öncesine kadar devam edilir.	200-300 ml (260-390 g)	1-2 L (1,3 - 2,6 kg) /da
Tropik Meyveler	Çiçeklenme döneminden meyve oluşuncaya kadar	200-300 ml (260-390 g)	2-3 L (2,6 - 3,9 kg) /da



Soil Application | Foliar Application



Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.

MEGAMIN®

SIVI FORMÜLASYON ÖZEL YAPRAK GÜBRELERİ

LIQUID ORGANIC FERTILIZER CONTAINING
VEGETABLE ORIGIN AMINOACID



Garanti Edilen İçerik

W/W

Organik Madde

%22

Organik Karbon

%12

Organik Azot

%2

Serbest Aminoasitler

%12

pH Aralığı

5-7

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan
Yumuşak Çekirdekli Meyveler	Tam vejetatif gelişim döneminden itibaren 15 günde bir 3 uygulama	200-400 ml/100 L su
Sebzeler	Şaşırtmadan sonra, Açık tarlada ve serada 10-15 günde bir uygulama	200-300 ml /da
Ayçiçeği	1. uygulama 4-6 yaprak dönemi, 2. uygulama 20 gün sonra	200 ml / da
Fidanlıklar	İlk yeni yapraklar oluştuğunda	100 ml / 100 L su
Badem	1. uygulama meyve tutumu sonrası, 2. Uygulama 20 gün sonra	250 ml / 100 L su
Domates, Biber (Tarla)	Şaşırtmadan 7 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama	200-300 ml / 100 L su
Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Patlıcan (Sera)	Şaşırtmadan 5 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama	200-300 ml / 100 L su
Sebze Damlama Sulama Uygulamaları	Şaşırtmadan 5 gün sonra, tüm gelişim dönemi boyunca haftada 1 uygulama	500 ml/da
Turunçgil	Çiçeklenme öncesi itibariyle 15-20 gün ara ile 7 uygulama	150-300 ml / 100 L su
Sert Çekirdekli Meyveler	Erken çiçeklenme dönemi itibariyle her 15-20 günde bir 3 uygulama	200-300 ml / 100 L su
Bağ	Bahar sürgün dönemi itibaren 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama	200-300 ml / 100 L su



Foliar Application



Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.

SIVI FORMÜLASYON DAMLAMA ÖZEL GÜBRELER

DRIP FERTILIZER

EXPRES S®

SIVI FORMÜLASYON DAMLAMA ÖZEL GÜBRELER

PH REDUCER LIQUID SULFUR
50% ORGANIC ACID AND
CARBOXYLIC ACID COMPLEX



Expres S® elementel kükürt carboxylic asit ve organik asit bileşenleri ile reaksiyon sonucu ortaya çıkmış toprakta tuzluluk giderici topraktaki çözünmeyen elementlerin çözümünü sağlaması ve topraktaki pH ı belli bir süre ve diğer bitki besin elementlerin alımına yardım sağlaması için geliştirilmiş bir üründür.

Bitki	Kullanım Şekli	Doz
Muz	Sezon boyu 4-5 uygulama	1-2 lt
Tüm Meyve Ağaçları Turunçgiller, Üzüm, Şeftali, Kayısı, Armut, Zeytin,	Sezon boyu 2-3 uygulama	1-2 lt
Yumrulu Bitkiler Patates, Sogan, Havuç, Kavun, Karpuz, Kabak vb	Söküm döneminde söküm öncesi 1 uygulama	2-3 lt
Endüstri Bitkileri Pamuk, Ayçiçeği, Mısır vb	Toprak hazırlığı 1 uygulama	2-3 lt

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dokümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



Toprak
Uygulaması



INNO LIQUIDO®

SIVI FORMÜLASYON DAMLAMA ÖZEL GÜBRELER

LIQUID ORGANIC FERTILIZER CONTAINING
VEGETABLE ORIGIN AMINOACID



Garanti Edilen İçerik	W/W
Organik Madde	%43
Organik Karbon	%13
Organik Azot	%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%2
Serbest Aminoasitler	%3
pH Aralığı	5 - 7

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan
Sera Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	75-100 ml/100 L Su
Açık Tarla Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	75-100 ml/100 L Su
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	75-100 ml/ Yeteri miktarda su ile
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Çiçeklenme başlangıcında ilk 20 gün sonra 2. uygulama	100-150 ml/100 L Su
Üzüm, Muz, Nar, İncir	Gelişim döneminde 20 gün ara ile 2-3 uygulama	75-100 ml/100 L Su
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden itibaren 20 gün ara ile 1-2 kez uygulanır.	100-150 ml/100 L Su
Mısır, Ayçiçeği, Kanola	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	100-150 ml/ Yeteri miktarda su ile
Pamuk	2. Uygulama elma başlangıcı	100-150 ml/ Yeteri miktarda su ile
Buğdaygiller	Kardeşlenme döneminde	100-150 ml/ Yeteri miktarda su ile
Baklagiller, Soya, Yerfıstığı,	Çiçeklenme öncesinden itibaren 2-3 uygulama	100-150 ml/ Yeteri miktarda su ile



 **Soil**
Application

 **Foliar**
Application



Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.

NUTRILIQ®

SIVI FORMÜLASYON DAMLAMA ÖZEL GÜBRELER

LIQUID ORGANIC FERTILIZER CONTAINING
ANIMAL ORIGIN AMINOACID



Garanti Edilen İçerik

W/W

Organik Madde

%44

Organik Karbon

%14

Organik Azot

%1

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O)

%4

pH Aralığı

5-7

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan
Sera Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	75-100 ml / 100 L su
Açık Tarla Sebzelerinde	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	75-100 ml / 100 L su
Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	75-100 ml / Yeteri miktarda su ile
Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Çiçeklenme başlangıcında ilk 20 gün sonra 2. uygulama	100-150 ml/100 L su
Üzüm, Muz, Nar, İncir	Gelişim döneminde 20 gün ara ile 2-3 uygulama	75-100 ml/100 L su
Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden itibaren 20 gün arayla 1-2 uygulama	100-150 ml/100 L su
Fındık, Ceviz, Kestane, Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden itibaren 20 gün arayla 1-2 uygulama	100-150 ml/100 L su
Mısır, Ayçiçeği, Kanola	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	100-150 ml/Yeteri miktarda su ile
Pamuk	1. Uygulama taraklanma başlangıcı 2. Uygulama elma başlangıcı	100-150 ml/Yeteri miktarda su ile
Baklagiller, Soya, Yerfıstığı,	Çiçeklenme öncesinden itibaren 2-3 uygulama	100-150 ml/Yeteri miktarda su ile
Şekerpancarı, Soğan, Patates,	4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 2-3 kez uygulanır	100-150 ml/Yeteri miktarda su ile

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dokümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



 **Soil**
Application

 **Foliar**
Application



NUTRIPHOS[®]

3-30-0 + ME

SIVI FORMÜLASYON DAMLAMA ÖZEL GÜBRELER

EC FERTILIZER - NP FERTILIZER SOLUTION



Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%3
Üre Azotu (N-NH ₂)	%3
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,3

Bitki	Kullanım Dönemi	Yapraktan
Turunçgil	Şubat ayı itibari ile 2-3 uygulama	1-2 L/da (1,3-2,6 kg/dal)
Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Fasulye, Çiçek vb.)	Fideler şaşırtıldıktan bir hafta sonra başlayarak meyve olgun- laşana kadar 1-2 uygulama yapılır.	1-2 L/da (1,3-2,6 kg/dal)
Yapraklı Yenen Kışık Sebzeler (Kıvrık, Marul, Lahana, Ispanak vb.)	Vejetasyon süresince 1-2 uygu- lama	1-2 L/da (1,3-2,6 kg/dal)
Yumru Bitkiler (Şekerpancarı, Patates Soğan, Sarımsak vb.)	Çapadan sonra bir uygulama 15-20 gün sonra ikinci uygulama	1-2 L/da (1,3-2,6 kg/dal)
Kavu, Karpuz, Kabak	Kol altında, meyve tutumunda 2-3 uygulama	1-2 L/da (1,3-2,6 kg/dal)
Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Zeytin, Bağ,)	Vejetasyon süresince 2-3 uygu- lama	2-2,5 L/da (2,6-3,25 kg/da)
Muz	Fide dikiminden bir ay sonra başlayarak doğuşuma kadar 4-5 uygulama	1-2 L/da (1,3-2,6 kg/dal)
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği vb.)	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2-3 uygu- lama	1-2 L/da (1,3-2,6 kg/dal)
Tahıllar (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik)	Kardelenme ve sapa kalkma döneminde 2 uygulama	1-2 L/da (1,3-2,6 kg/dal)

Ürün hakkında detaylı bilgi ve tescil dökümanlarına web adresimizden ulaşabilirsiniz.



AgroLanter®

HIGH QUALITY FERTILIZER

Bitkiye Sevgi, Tarıma Güç
Kaliteli Ürünlerle Fark Yaratın



agrolanter.com

AgroLanter®

HIGH QUALITY FERTILIZER

AGROLANTER SOLUTIONS
GÜBRE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Akdeniz Mah. Karataş Bulv. No: 397
İç Kapı No Z01 Yüreğir/Adana

www.AGROLANTER.com

   **AGROLANTER**